

- Ei muistintpanoja, kirjallisuutta, laskinta.
- Kirjoita papereihin nimesi, numeroisi ja koulutusohjelmäsi.

1. Funktiolle  $f(t) = |\sin(t)|$  tunnetaan (Kirjan esimerkistä) Fourier-sarja

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} \cos(2nt)$$

a) Muodosta tästä Fourier-sarja funktiolle  $g(x) = |\cos(x)|$  | yhtiön  $\cos(x) = \sin(x+\pi/2)$  avulla. [4 pistettä]

*Ohje:* Muuttujan vaihto  $t = x+\pi/2$  funktioon ja sen sarjan näyttää ensi vilkaisulla muuttuvan sarjan pois Fourier-sarjan rakenteesta. Varmista a-kohdassa, että näin ei kuitenkaan käy, käyttäen sopivampaa kaavoista

$$\sin(u+v) = \sin(u)\cos(v) + \cos(u)\sin(v), \quad \cos(u+v) = \cos(u)\cos(v) - \sin(u)\sin(v).$$

b) Tuotta (isi)vatko a-kohdan sarjan osasummat Gibbsin ilmiön pisteessä  $x = \pi/2$ ? Perustele. [2 pistettä]

2 a) Muodosta tehtävässä 1 annetusta funktion  $f(t)$  Fourier-sarjan kompleksiversio

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega t},$$

missä

$$c_0 = \frac{1}{2}a_0, \quad c_n = \frac{1}{2}(a_n - jb_n), \quad c_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + jb_n) \quad (n \geq 1)$$

b) Olisiko (jos muodostettaisiin) tehtävän 1 funktion  $f(t)$  Fourier-sarjasta lennettään derivoimalla saatava sarja derivaatan  $f'(t)$  Fourier-sarja? Perustele.

3. Tasapulssille

$$f(t) = \begin{cases} A & (|t| \leq T) \\ 0 & (\text{muulloin}) \end{cases}$$

livedetään Fourier-muunnos  $F(j\omega) = 2AT \text{sinc}(\omega T)$ . Johda muunnos

a) tasapulssille  $H(t) - H(t-T)$ ,

b) iikunoidulle sinille  $x(t) = \sin(\omega_0 t) [H(t) - H(t-T)]$ .

*Apuna:* Jos  $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(j\omega)$ , niin  $\mathcal{F}\{f(t-t_0)\} = e^{-j\omega t_0} F(j\omega)$  ja  $\mathcal{F}\{e^{at} f(t)\} = \mathcal{F}\{f(\omega-a)\}$  ja  $\mathcal{F}\{F(j\omega)\} = 2\pi f(-\omega)$  ja  $\mathcal{F}\{f(-t)\} = F^*(j(-\omega))$ .

4 a) 'On-off' -pulssin esitys Fourier-integraalina

$$f(t) = \begin{cases} A & (-T \leq t < 0) \\ -A & (0 \leq t < T) \end{cases} = \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \frac{1}{2\pi} e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau \right] d\omega$$

sievenee, kun sisempi integraali korvataan valmiiksi lasketulla pulssin Fourier-muunnoksella  $F(j\omega) = AT^2 j\omega \text{sinc}^2(\omega T/2)$ . Tee tämä sievennys!

b) Edellä saadun integraalin ilklarvo

$$f(t) \approx \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_0}^{\omega_0} \dots d\omega$$

sievenee vielä lisää. Tee tämä sievennys mahdollisimman pitkälle!

*Vihje:* Parillisuus ja parittomuus ja origokeskinen väli.)